



Методи діагностики та лікування обтурації шлунково-кишкового каналу у собак






Наукові керівники

Ткаченко С.М. - к. вет. н., доцент кафедри хірургії
і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка
Білошицький Р.В. - аспірант

Робота виконана на кафедрі хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка. Клініко-експериментальні дослідження виконані на базі ветеринарної клініки АТЗТ “Дунай”, м. Київ.

Метою роботи є своєчасне обстеження тварин з підозрою на обтурацію шлунково-кишкового каналу і проведенням додаткових методів дослідження та визначення методів консервативної допомоги або оперативного втручання з наступним видаленням сторонніх тіл та проведенням якісного післяопераційного моніторингу.





Сторонні тіла в шлунково-кишковому каналі у дрібних домашніх тварин є достатньо поширеною хірургічною патологією у ветеринарній медицині, при якій клінічні ознаки на початковій стадії обтурації є малоспецифічними.

Клінічна та інструментальна діагностика в багатьох випадках представляє собою серйозну проблему, а відсутність якісної діагностики має несприятливі наслідки для моніторингу хворого пацієнта і відкладання оперативного втручання з подальшою хірургічною допомогою.

Клінічно наявність сторонніх тіл в ШКК може проявлятися наступними симптомами:

- занепокоєнням тварини
- зниженням або відсутністю апетиту
- раптовою блювотою
- гіперсалівацією
- відмічається болючість при пальпації черевної стінки (“гострий” живіт)
- здуттям живота (метеоризм кишечника)
- відсутністю акту дефекації (копростаз)

Найбільш інформативними методами діагностики є:

- Рентгенографія (оглядова або з використанням контрастних речовин, такі як барію сульфат)
- Гастроскопія




Патології, які пов'язані з непрохідністю шлунково-кишкового

■ Сторонні тіла ■ інші патології



Обструкція сторонніми тілами

■ Стравохід ■ Шлунок ■ Тонкий кишечник ■ Товстий кишечник



Видалення стороннього тіла з кишечника собаки породи лабрадор










Порушення моторної функції шлунково – кишкового тракту (серед хірургічних патологій) відбувається за рахунок:

- потрапляння стороннього тіла в шлунок або кишечник
- онкологічні процеси
- наслідок завороту або інвагінації кишечника
- в результаті атонії шлунково-кишкового тракту




Видалення стороннього тіла з кишечника у добермана





Виявлені сторонні тіла

■ Гумові і пластикові м'ячики ■ Капронова нитка ■ Целофановий пакет ■ Кістка яловича



Висновки і пропозиції

1. Для своєчасної діагностики сторонніх тіл в шлунково-кишковому каналі необхідно проводити комплексне діагностичне дослідження, яке спрямоване передусім на введення рентгенконтрастних речовин через ротову порожнину.
2. Додаткові методи візуалізації (ультразвукова діагностика, рентгенологічне дослідження) дозволяють в повній мірі відобразити наявність сторонніх тіл в організмі тварини при повному дотриманні схеми клінічного дослідження.
3. Якісне клінічне обстеження і вчасно зібраний анамнез від власника тварини надає змогу настановити лікаря на думку про використання основних і додаткових методів обстеження пацієнта з наступною шпиталізацією з невідкладними заходами щодо усунення небезпечного стану і розвитком ускладнень.

Дякую за увагу

